~~N° 159~~ n° 77.

hernie. ~~[illegible]~~ Observation

de l'arc du colon.

Comme il m'a paru surprenant que l'arc du colon pût s'engager dans l'anneau de l'oblique ~~externe~~, j'ai cru devoir en faire part à l'académie

Le nommé antoine gabriel Bressant agé de 40 ans avoit depuis long tems une hernie inguinale qui quoi que d'un volume assez considérable, l'incommodoit si peu qu'il négligeoit de porter un bandage. Le onze novembre 1766 les accidens de l'étranglement étant survenu il fut amené à l'hôtel Dieu le douze et opéré le lendemain matin. A l'ouverture de la tumeur on trouva une grosse masse d'epiploon très enflammé, et environ la moitié du cylindre de l'intestin assez rouge et légérement adhérent: l'anneau incisé et ces adhérences détruites, on fit rentrer l'intestin, puis ayant lié l'épiploon trois travers de doigt au dessous de l'anneau on en retrancha l'excédent.

L'opération parut avoir le succès le plus heureux, les vomissemens cesserent, les selles se rétablirent, et le poulx devint plus fort et plus développé, circonstances qui annonçoient la résolution de l'inflammation de l'intestin; cependant le malade s'affoiblissoit beaucoup, et la suppuration n'étoit pas encore établie le septiéme jour de l'opération, lors que pour rendre les pansemens plus faciles on emporta le reste de l'épiploon après avoir fait une seconde ligature près l'anneau. Depuis ce tems le malade resta à peu près dans le même état de foiblesse, le ventre devint un peu tendu et douloureux et la mort arriva le neuviéme jour de l'opération.

Curieux de savoir si les effets de la ligature de l'épiploon seroient les mêmes que ceux que j'avois remarqués dans une semblable occasion, je fis l'ouverture du cadavre

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

ARC 15 d 74

Je trouvai la portion d'épiploon qui naît de l'éstomac dans son état naturel, et sans tension. A l'égard de celle qui part de l'arc du colon je ne l'aperçus pas d'abord, car cet arc avoit été entrainé vers l'anneau de l'oblique externe du côté droit, ses extrémités étant restées attachées au commencement du duodenum et à la ratte. La portion droite de cet arc ainsi renversé étoit adhérente à toute la partie du colon qui s'étend depuis l'origine de cet intestin jusqu'au foye; l'une et l'autre avoient au moins trois pouces de diamètre, dilatation qui finissoit peu après l'endroit où le colon repondoit à l'anneau L'intestin étoit enflammé dans toute l'étendue de cette dilatation, et gangréné ~~à l'anneau~~ au voisinage de l'anneau. Il restoit à peine dans le ventre quelques vestiges de la portion d'épiploon à laquelle le colon sert d'attache, elles étoit sortie par l'anneau, et la ligature qui en avoit été faite anticipoit un peu sur cet intestin.

Si cette observation n'enrichit par la pratique chirurgicale elle ajoute, au moins, aux raisons déduites par l'académie sur la nécessité de faire rentrer une partie de l'épiploon avant d'en faire la section, surtout quand cette membrane est en grande quantité dans la hernie.

Jabet chirurgien gagnant maîtrise à l'hôtel dieu –